

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

RATTOFENE PASTA

BIOCIDA – Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2013/00112/MRA

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN PASTA FRESCA AROMATIZZATA BURRO DI ARACHIDI PER USO PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Difenacoum | 0,005 g |
| Denatonium benzoate | 0,001 g |
| Sostanze appetibili e coformulanti | q.b. a 100 g |

Caratteristiche

RATTOFENE PASTA è un'esca rodenticida a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Difenacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione.

RATTOFENE PASTA contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

Per uso professionale può essere usato all'interno ed intorno a edifici industriali (anche deposito merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e relativi giardini e nelle fognature.

Per uso NON professionale può essere usato all'interno ed intorno ad abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

Istruzioni, modalità d'uso e dosi d'impiego

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati.

Per uso professionale. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. L'esca rodenticida deve essere inserita in un adeguato contenitore, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio ed in modo da evitare la dispersione nell'ambiente.

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso.

Per uso NON professionale. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. Le esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e debitamente marcati, disponibili in commercio. I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che il contenitore sia fissato in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori.

Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza. Le dosi consigliate sono:

| | |
|---------------------|--|
| Topolino domestico: | fino a 40 g ogni 5 m (infestazione bassa) o ogni 2 m (infestazione alta) |
| Ratto grigio: | fino a 200 g ogni 10 m (infestazione bassa) o ogni 5 m (infestazione alta) |
| Ratto nero: | fino a 200 g ogni 10 m (infestazione bassa) o ogni 5 m (infestazione alta) |

Controllare regolarmente i contenitori con le esche e sostituire le esche consumate. Durante le operazioni di controllo per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste. Usare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori contenenti le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente la scheda di sicurezza. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

Confezioni: esche rodenticide in bustine in carta alimentare

- Per Uso Professionale fino a 25 Kg
- Per Uso NON Professionale fino a 500 g